

Nomenclature des variétés connues de cette espèce.

R. BREVISTYLA.

- R. *Germinibus ovatis glabris; pedicellis hispидulis aliquando glabris; laciniis calycinis pinnatifidis; stylis in columnam glabram brevem coalitis.* (N.)
 R. *Brevistyla*. D C. Fl. franç. vol. 6, p. 537.
 R. *Leucochroa*. DESV. Journ. Bot. 2, p. 316, *ibid.* 1813, p. 113. LOIS. not. p. 80.
 D C. cat. monsp. p. 138, n° 6.

Les Rosiers suivants composent la quatrième division de la série des Rosiers à styles soudés (voyez page 90).

- α. R. *Brevistyla leucochroa*.
 R. *Brevistyla petalis albis basi flavidis*. D C. Fl. franç. vol. 6, p. 537, v. α.
 R. (*Leucochroa*) DESV. l. c. Tab. 15. D C. cat. monsp. 138.
 R. *Germinibus ovatis pedunculisque glabris; calycinis laciniis pinnatifidis, foliolis ovatis glabris lucidis, stylis subsessilibus connato-capitatis, glabris*. LOIS. not. p. 80.
 β. R. *Brevistyla lactea*.
 R. (*Leucochroa*) *lactea fl. candidis*. LOIS. l. c.
 R. *Brevistyla petalis lacteis*. D C. Fl. franç. l. c. v. β.
 Cette variété ressemble à la première, mais ses fleurs sont parfaitement blanches.
 γ. R. *Brevistyla systyla*.
 R. (*Systyla*) *calycum tubis ovatis glabris; pedunculis hispидulis; petiolis nervisque pubescentibus; foliolis ovato-lanceolatis glabris; floribus solitariis; stylis in columnam cylindricam coalitis*. BAST. supp. à la Fl. de Maine-et-Loire, p. 31.
 R. *Brevistyla petalis pallide roseis*. D C. Fl. franç. l. c. v. γ.
 R. (*Leucochroa*) *angusta*. DESV. Journ. 1813, l. c. v. β.

Ces Rosiers croissent dans le Haut-Poitou, dans l'Anjou, et il est vraisemblable qu'on les trouvera encore ailleurs quand on prendra la peine de les chercher. La variété γ est plus rare que les autres. Toutes trois nous ont été envoyées de La Flèche, par M. LE MEUNIER, et nous les cultivons avec succès.